

Křížovka – zkontroluj si řešení.


									1	P	U	Č	E	N	Í
									2	U	L	I	T	A	
									3	B	O	U	B	E	L
4	R	O	Z	P	T	Ý	L	E	N	Á					
									5	P	O	L	Y	P	
									6	P	R	V	O	C	I
									7	M	O	T	O	L	I
									8	S	L	I	Z		

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

KORÝŠI

Rak říční

- 25 cm
- 15 – 20 let
- v čisté tekoucí vodě



kriticky ohrožený druh

[cit. 2020-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: WARD, Artemas.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_%22red-clawed%22_crayfish,_photo_from_The_Encyclopedia_of_Food_by_Artemas_Ward.jpg

Obrázek si schematicky jednoduše nakresli do sešitu a popiš.

**krátká tykadla
(čich)**

**dlouhá tykadla
(hmat)**

hlavohrud'

klepeta

oči

krunýř

klepítka


**kráčivé končetiny
(5 párů)**

zadeček

**zadečkové
nožky**

ploutvička

drápky



- indikátor čistoty vody
- krunýř – neroste, mláďata ho svlékají několikrát do roka
 - vylučuje ho pokožka, rak v úkrytu dokud se nezpevní nový
- dýchá žábry
- trávicí trubice – jícen, žaludek, střevo
- potrava – živočichové i odumřelí a rostliny
- nervová soustava žebříčkovitá se zauzlinami
- rozmnožování
 - samec při páření na podzim přilepuje spermie na břicho samice
 - samice uvolní vajíčka a dojde k oplození - oplození vnější
 - oplozená vajíčka si přilepuje na zadečkové nožky a nosí je s sebou
 - v létě se líhnou raci – vývin přímý

Rak bahenní

- širší klepeta
- 30 cm
- i mírně znečištěné vody

[cit. 2020-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: HERGET, Cornellius.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Blausteinsee_Tierwelt_05.jpg



Rak kamenáč

6 – 9 cm

pod kameny

[cit. 2020-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: LEEB, Christoph.
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Steinkrebs.jpg>

